



專欄

點擊發掘更多內容




養和醫療集團 – 心臟衰竭死亡率高 及早治療 助控病減死亡風險 | 養和專科精選

專欄

發佈時間：2024-05-31 02:00 HKT

更新時間：2024-05-31 02:00 HKT



隨著年齡增長，不少人認為心臟機能下降屬正常不過，低估了心臟衰竭的嚴重性，導致延誤治療。心臟科專科黃民樂醫生直言，心臟是人體很重要的器官，如果出現衰竭，便無法泵出足夠血液供應身體所需，影響患者的健康和生活，嚴重時更會危及性命。有數據顯示，心臟衰竭的死亡率比癌症還高，故建議市民多加留意，只要及早治療，可有效控制病情。

✍ 發表回應



🔗 分享



專欄

點擊發掘更多內容



積極治療 減死亡風險

不過，在使用各種對應治療的前提下，藥物始終是治療心臟衰竭重要的一環。黃醫生指出，現時用於治療心臟衰竭主要有4大支柱藥物，包括鹽皮質激素受體拮抗劑(MRA)、腦啡肽酶抑制劑配合血管收縮素受體抑制劑(ARNI)、 β 受體阻滯劑(Betablocker)及 SGLT2抑制劑。「臨床證實，4大支柱藥物可有效降低患者因心臟衰竭入院的比率，甚至死亡的風險。」另外，醫生亦會因應患者的病情，輔以其他藥物，以及儀器輔助治療，詳情可向醫生查詢。

養和醫療集團



發表回應



分享



黃醫生指出，繼發性心臟衰竭可由冠心病、心律不正、心瓣及心臟肌肉疾病等心臟問題引起。

[瀏覽更多文章 >](#)

相關推薦



養和醫務集團 – 及早測出致敏源頭
哮喘、濕疹與食物過敏 ...

專欄

202

00 HKT



Open



養和

– 老人科專科服務 提

[發表回應](#)[分享](#)